



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI MUREȘ
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL
BOLILOR TRANSMISIBILE

Târgu-Mureș, str.Gh. Doja Nr 34

www.aspms.ro

Tel: 0265-269880, 0265-261278

Nr: 665 / II / 2010-06-28

Fax: 0265-269880

E-mail: epid@aspms.ro, statepid@aspms.ro

Către

Cabinetul medical individual _____

Conform adresei MS DSPCSP Nr. 39588 / 25.06.2010, data estimată de livrare a vaccinului BCG către DSP este 30.06.2010.

În vederea derulării în bune condiții a vaccinărilor de recuperare a tuturor copiilor care au fost născuți în perioada februarie – iunie 2010 și nu au fost vaccinați în maternitate , vă rugăm să raportați telefonic la compartimentul de epidemiologie telefon 0265 269880, numărul copiilor catagrafiati , defalcat pe luni . **Raportarea se face până în data de 01.07.2010, conform tabelului de mai jos.**

Total copii catagrafiati	Luna februarie	Luna martie	Luna aprilie	Luna mai	Luna iunie

Vă transmitem instrucțiunile de utilizare a vaccinului BCG.

DIRECTOR COORDONATOR
DR. VASILE ADRIAN MUREȘAN

SEF SERVICIU EPIDEMIOLOGIE
DR. MARIALAKI ELLA

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A VACCINILUI BCG

Vaccinul BCG va fi utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinați în perioada februarie – iunie 2010, cât și pentru vaccinarea de rutină a nou – născuților, conform calendarului.

Vaccinarea se va realiza fără testare tuberculinică prealabilă, dar cu efectuarea și consemnarea unui examen clinic înainte de vaccinare, la fel ca pentru orice altă vaccinare.

Descriere

Preparatul este un vaccin viu atenuat, liofilizat, obținut din culturi de Bacil Calmette – Guerin și se administrează intradermic.

Mod de administrare

Doza vaccinală:

- pentru copiii cu vârste sub 1 an – 0,05 ml vaccin reconstituit, administrat intradermic;
- suspendarea vaccinului se va realiza cu solventul aferent, iar administrarea se va realiza cu seringi de 1 ml, cu ac pentru administrare intradermică.

La locul inoculării, pielea se curăță cu antiseptic și se usucă înainte de administrare.

Condiții de păstrare și de transport

Deoarece este sensibil la lumina naturală, vaccinul BCG se păstrează la întuneric.

Flacoanele deschise ce conțin vaccin BCG reconstituit nu pot fi utilizate decât maxim 6 ore și vor fi păstrate în condiții de temperatură de 2 – 8 °C, la frigider.

Vaccinul trebuie depozitat în spații uscate și întunecoase, la o temperatură cuprinsă între 2 – 8 °C. De asemenea, în timpul transportului va fi asigurată protecția vaccinului față de lumină, temperatura de transport fiind de 2 – 8 °C.

Concomitențe

Conform recomandărilor producătorului, vaccinul BCG poate fi administrat în același timp cu alte vaccinuri : DTP, DT, VPI, Hepatic B sau vaccinuri combinate inactive.

În acest sens, se va întocmi pentru fiecare sugar un plan de recuperare a vaccinărilor astfel încât între vaccinurile anterioare și BCG să se respecte un interval de 2 săptămâni, iar între BCG și alte vaccinuri un interval de 30 zile.

Contraindicații și precauții - vor fi respectate contraindicațiile vaccinării BCG:

- a) temporare – stare febrilă, leziuni tegumentare eruptive, greutate sub 2500 g
- b) absolute – infecție HIV, imunodeficiențe congenitale, leucemii, limfoame, neoplazii, tratamente imunosupresoare (cu corticoizi, agenți alkilanți, antimetaboliți etc).

Sugarii cu contraindicații temporare vor putea fi vaccinați după dispariția contraindicației respective.